

AK-LOMMETIPS

Patienter der skal henvises til Tromboseklinikken (TK):

Alle, som er **ny-ordinerede i AK-behandling** med præparaterne:

- Marevan
- Eliquis – Xarelto – Pradaxa – Lixiana
- Lavmolekylært heparin



Der kan henvises patienter med:

- Opstart af Marevan og Fragmin
- Dysreguleret INR
- Skift fra en AK-type til en anden

Ved henvisning til TK er det vigtigt at:

- Udfylde **SFI "Antikoagulation, behandlingsplan"**
- Lægge patientdata på **patientlisten "Trombose-henvisning til AK-spl-Hjertesygdomme klinik AUH"** i EPJ

DOAK (=NOAK) må ikke anvendes til:

Mekaniske hjerteklapper –
mitralstenose (kun moderat og svær) –
svært nedsat nyrefunktion – graviditet og
amning – antifosfolipidsyndrom.

AK-LOMMETIPS

5 punkter du skal overveje forud for ordination af AK-behandling:

1. Indikation
2. Kontraindikation
3. Dosering
4. Interaktion
5. Opfølgning



Husk - stillingtagen til varighed af AK-behandling.

Skal patienten følges i TK:

Husk at lave aftale herom **inden** udskrivelse.

Når der ordineres Marevan:

- Vær opmærksom på compliance
- Kan patienten komme til INR kontrol på AUH

OBS: TK har et lager af forfyldte Fragmin sprøjter i alle styrker, der kan hentes.

Der udleveres min. 10 stk. til patienten.

Kontakt gerne Tromboseklinikken tlf. 4012 7473



Se mere på:

AK-behandling.rm.dk